G.I.S.M.A.D.

Gruppo **I**taliano per lo **S**tudio della **M**otilità dell' **A**pparato **D**igerente

IT.ACA

registro **IT**aliano dei pazienti affetti da **ACA**lasia

Raccolta su scheda elettronica dei dati di pazienti affetti da acalasia in Italia (periodo 2012-2015)

- Dati anagrafici
- Dati Clinici
- Diagnosi
- Trattamento

V.Annese, F.Baldi, R. De Giorgio, F. Torresan

Centri partecipanti

n. 335 pazienti

Centri partecipanti

Centro	Referente
Gastroenterologia SOD2 - AOU Careggi - Firenze	Dott.. Annese
Policlinico S.Orsola Malpighi - Bologna	Dott. Torresan
Seconda Università degli Studi di Napoli	Prof. Di Martino
A.O.U. di Padova - Policlinico Giustinianeo	Dott.ssa Galeazzi
Azienda Ospedaliera Brotzu - Cagliari	Dott. Satta
A.O.U. "Federico II" - Napoli	Prof.. Cuomo
Osp. Casa Sollievo Sofferenza - S. Giovanni Rotondo	Dott. Andriulli
Sapienza - Università di Roma	Prof.. Corazziari
A.O.R.N. “San G.Moscati”-Avellino	Dott. D’Onofrio
Ospedale Civile di Sassari	Dott. Uneddu

Distribuzione geografica dei pazienti



Distribuzione per età

(al momento della diagnosi)

media 60,0 ± 18.7 anni, mediana 62 (range 17-102)



Distribuzione per sesso/età





Distribuzione per durata della malattia

(intervallo tra esordio e diagnosi)



Durata della malattia in mesi: Media 36.7 ± 63.5
Mediana 15 (r 0-660)

Caratteristiche dei pazienti e durata della malattia

(mesi)







Malattie concomitanti

Malattie concomitanti (174 pazienti)	Prevalenza (%)
Ipertensione arteriosa	6,8
Cardiopatia	2,3
Diabete	1,7
Ischemia cerebrale	0,6
Parkinson	0,6
Altro	10,9

Familiarità nel 1.5 %

Sintomi

	ESORDIO	DIAGNOSI
DISFAGIA	96,6 %	100 %
RIGURGITO	64,6 %	75,8 %
DOLORE RETROSTERNALE	38,9 %	61 %
CALO PONDERALE	57,7 %	76,8 %

Frequenza , gravità ed evoluzione dei sintomi

ESORDIO



DIAGNOSI



Informazioni sulla gestione diagnostica

EGDS (n. 154 pz)

Negativa	Ristagno liquidi	Ristagno solidi	Esofagite
21,9 %	41,2 %	19,4 %	5,2 %

Rx (n. 111 pz)

Diametro max dell'esofago

< 3 cm	3-5 cm	> 5 cm
26.7 %	50 %	23.2 %

Correlazione tra diametro dell'esofago (RX) e durata della malattia



Informazioni sulla gestione terapeutica (n.180 pazienti)



Gestione terapeutica dei pazienti



( ) = numero di trattamenti

Caratteristiche dei pazienti e trattamento

PD





BOTOX





MIOTOMIA